

NOTES RELATIVES AU SERVICE DE LA CULTURE,

PAR M. D. BOIS.

Parmi les floraisons constatées dans les serres depuis la Réunion précédente, il y a lieu de noter les suivantes :

Monocotylédones.

Acanthostachys strobilacea Link;
Echmea crocophylla J. G. Bak.;
Aerides odoratum Lour., var. *cornuta*;
Aglaonema simplex Blume;
Albuca Fleckii Schinz;
Anthurium Bakeri Kth.,
— *cristallinum* Linden,
— *glaucescens* de Smet,
— *illustre* Hort.,
— *lenconeuron* Lem.,
— *Martianum* K. Koch,
— *pedato-radiatum* K. Koch,
— *radiatum* Schott,
— *reticulatum* Benth.;
Arengelia Morreniana Mez;
Billbergia pyramidalis Lindl.,
— *speciosa* Thunb., var. *elegans*,
— *viridiflora* H. Wendl.,
— *Wiotiana* de Jonghe;
Bulbophyllum cupreum Lindl.,
— *gymnopus* Hook. f. (Guillaumin determ. ⁽¹⁾);
Calanthe veratrisfolia R. Br.;

Carludovica lancifolia;
Cirrhopetalum guttulatum Hook. f.,
— *Thouarsii* Lindl.;
Codonanthe Deros'ana Lem.,
Cryptanthus Oxyanus Hort. Makoy;
Cypripedium Curt'sii Rehb. f.,
— *insigne* Wall., var. *Chantui*,
— *Io* Rehb. f.,
— *marmorophyllum* Stein (*Hookeri* ♀ × *barbatum* ♂),
— *waauthum* Hort., var. *superbum*,
— *tonsum*, var. *superbum*;
Dracaena fragrans Gawl., var. *Lindenii*;
Dendrobium aduncum Wall.,
— *flabellum* Rehb.;
Diascorea transversa R. Br.;
Epidendrum cochleatum L.;
Eucharis grandiflora Planche.;
Hippeastrum rutilum Herb.;
Hymenocallis caribea Herb.;
Karatas candida Hort.,
— *hybrida* Hort.,
— *neglecta* Baker;
Listrostachys pertusa Rehb. f. (Guillaumin déterm. ⁽²⁾);

⁽¹⁾ Cette espèce rare de la région himalayenne a été donnée au Muséum, en 1913, par M. Lionet, l'orchidophile bien connu; son introduction n'avait pas encore été signalée.

⁽²⁾ Plante rapportée par M. Pobéguin, en 1913, du Congo français, où cette espèce n'avait pas encore été signalée.

Masdevallia bella Rehb. f. ,
— *infracta* Lindl. ,
— *simula* Rehb. f. ;
Maxillaria Houtteana Rehb. f. ;
Octomeria Glazioveana Regel ;
Philodendron crassinode Hort. ;
Pitcairnia heterophylla Beer ;
Pleurothallis lilacina B. Rodriguez
 (Guillaumin déterm.⁽¹⁾) ,
— *polystachya* A. Rich. et Gal. ;
Polystachya bracteosa Lindl. ;
Remusatia vivipara Schott ;
Stelis Losgrenii Cogn. (Guillaumin
déterm.) ;
Tetramicra bicolor Benth. ;
Tillandsia vestita Cham. et Schlecht.

Dicotylédones.

Acalypha hispida Burm. ;
Bauhinia Vahlii W. et A. ;
Begonia argento-guttata Hort. ;
Bouvardia triphylla Salisb. ,
Cerbera Odollam Gærtn. ;
Chloranthus inconspicuus Sw. ;
Clavija brachystachys Brongn. , ma-
nuser. ;

Clerodendron ligustrinum R. Br. ;
Coprosma lucida Forst. ;
Echinopsis minuscula Web. ;
Epiphyllum Gærtneri K. Schum. , var.
 Makoyana :
Hoffmannia discolor Hemsl. ;
Hoya bella Hook. , var. *Paxtoni* ;
Jacobinia magnifica Benth. et Hook. ,
 var. *carnnea* ;
Kalanchoe × Kerensis (*flammea* ×
 Bentii) ;
Kanahia glaberrima N. E. Br. ;
Kiggelaria africana L. ;
Mumillaria stella-aurata Mart. ;
Mascarenhasia elastica K. Schum. ;
Phyllocactus Hookeri Walp. ;
Rauwolfia canescens L. :
Ribes rugosum Coville et Rose (Guil-
 laumin déterm.⁽²⁾) :
Rivina humilis L. ,
— var. *canescens* ;
Ruellia solitaria Vell. ,
— *rosea* Hemsl. ;
Salvia Regla Cav. ;
Sempervivum brachycaulon Webb et
 Berth. ;
Spigelia splendens Ker-Gawl.

A signaler, en plein air (carré des couches), la floraison de *Sorbus amurensis* Koelne (Cardot déterm.), espèce récemment décrite (1912), originaire de la région de l'Amour et de la Mandchourie, reçue en 1912 du Jardin botanique de Saint-Pétersbourg sous le nom de *S. tianschanica* Rupr.; a donné quelques fruits en 1919.

⁽¹⁾ Recueilli au Brésil par Binot; donnée par M. Lionet, en 1913, au Muséum; y a fleuri en 1920; avait déjà fleuri à Kew en 1915.

⁽²⁾ Espèce décrite seulement en 1905; envoyée du Mexique par M. Dugès, en 1904.